

# Vorbereitung der Xpert<sup>®</sup>-Kartusche

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

**Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.**

Ein Exemplar des SDB (Sicherheitsdatenblatts) ist auf [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com) abrufbar.

Die Kontaktinformationen aller Vertretungen des technischen Kundendiensts von Cepheid finden Sie auf unserer Website: [www.cepheid.com/en/CustomerSupport](http://www.cepheid.com/en/CustomerSupport).



- 1 Für jede Probe eine Xpert Kartusche verwenden.



- 2 Das Röhrchen 5-mal rasch invertieren.



- 3 Den Kartuschendeckel öffnen.



- 4 Mit einer sauberen 300- $\mu$ l-Pipette (wird mitgeliefert) 300  $\mu$ l (eine Pipettenfüllung) der Probe in die Öffnung der Kartusche transferieren.



- 5 Den Kartuschendeckel schließen.



- 6 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.