



Auf Surveillance kommt es an

PCR-Schnelltests für eine optimale Infektionskontrolle

Der Infektionsschutz spielt eine wichtige Rolle für die Sicherheit von Patient/innen und das Vermeiden von Ausbrüchen. Hierbei unterstützt Sie das GeneXpert® System von Cepheid in Ihrem Krankenhausalltag durch die Bereitstellung von schnellen PCR-Ergebnissen.



Für Patient/innen

- Schnellere Entisolierung der negativen Patient/innen
- Reduzierung unnötiger Antibiotikaprophylaxe
- Aufenthalt in einem Krankenhaus, das frei von nosokomialen Infektionen ist



Für Klinikpersonal

- Schnelle Ergebnisse können das Patientenmanagement verbessern
- Isolierungen nur bei Bedarf
- Angemessenerer Einsatz von Antibiotika



Für Ihr Krankenhaus

- Reduzierung von Transmissionen und Ausbrüchen
- Besseres Patientenmanagement
- Kostenreduzierung und bessere Budgetkontrolle (Isolation, Aufenthaltsdauer, weniger Antibiotika)




Gleich weshalb ein Patient ins Klinikum kommt, wird geschaut ob er ggf. mit einem relevanten Keim [MRE & Co.] kolonisiert ist. Um jederzeit mögliche Transmissionen innerhalb unserer Klinik bestmöglich zu minimieren, geschieht dies wann immer möglich im Bereich der Zentralen Notaufnahme. Somit wird aus Zufall und Beliebigkeit eine [Diagnostik-] Strategie. In unserem MRE-Netzwerk setzen wir mitunter auf die Cepheid PCR Optionen. Neben einem deutlichen zeitlichen Vorteil stellt dies für uns ein Maximum an Patienten- und Personal-Prävention dar.“

Hans Eberhardt
Leitung Infektionsstation
Klinikum Heidenheim (Deutschland)

Auswirkungen auf den Testablauf

Die Testlösung von Cepheid liefert vor Ort medizinisch aussagekräftige Informationen für ein besseres Patientenmanagement



Eine Plattform. Mehrere Tests.

Die bewährte Kartuscentechnologie bietet dem Infektionsschutz Ergebnisse in Laborqualität




➔ Besuchen Sie uns auf www.cephheid.com/DE und erfahren Sie mehr über die CE-IVD-Tests von Cepheid, die auf dem GeneXpert system laufen.

Die Laufzeit hängt vom jeweiligen Test ab. Genaue Angaben zur Laufzeit entnehmen Sie bitte der jeweiligen Packungsbeilage.

* Vorzeitiger Abbruch des Assays (Early Assay Termination, EAT) nur bei positiven Ergebnissen bei In- uenza oder nur bei RSV. Ausgabe von negativen Ergebnissen und Ergebnissen von Kombinationstests in 30 Minuten.

^ Vorzeitiger Abbruch des Assays (EAT, Early Assay Termination) bei SARS-CoV-2. Negative Ergebnisse nach ca. 45 Minuten.



Möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Nicht in den USA erhältlich.

NIEDERLASSUNG IN DEUTSCHLAND

Europark Fichtenhain A 4
47807 Krefeld

TEL. +49 (0) 2151 3280 000
FAX +49 (0) 211 298 943 8

E-MAIL kundenservice@cephheid.com

NIEDERLASSUNG IN DER SCHWEIZ

Zürcherstrasse 66
8800 Thalwil

TEL. +41 44 722 50 10
FAX +41 44 732 67 07

E-MAIL ordersswitzerland@cephheid.com

ZWEIGNIEDERLASSUNG IN ÖSTERREICH

Hernalser Hauptstrasse 219
1170 Wien

TEL. +43 (0) 72 03 800 90
FAX +43 (0) 12 53 672 279 14

E-MAIL ordersaustria@cephheid.com

www.Cepheid.com/de

© 2022 Cepheid 3219-01G